

IMÁGENES DE AYUDA


ALAS DE ADULTOS

Una vez identificada el ala como perteneciente a una becada adulta el segundo paso es conocer si la muda fue completa e incompleta.

Las plumas guía son las dieciséis RS las diez CPI y las dieciséis CSI. La característica de las plumas no mudadas es su color mas apagado o desvaído, Se nota mejor esa diferencia y es pues mas perceptible en las franjas oscuras de las RS observadas por su cara superior.

En las CSI y CPI, además de ser menos oscuras las franjas transversales observamos un cierto color amarillento general en las plumas no mudadas. Ver: [LAS PLUMAS GUIA](#)

Es inconfundible pero tenemos que ver unas cuantas. Además muy importante es que **siempre las apreciaciones están en función de la comparación con las otras plumas adyacentes**. También deben ser observadas, con buena luz, bien diurna o en todo caso con un buen foco de luz blanca. Mejor un foco halógeno Es conveniente imprimir movimientos suaves de oscilación bajo la lámpara para que el ángulo de incidencia de la luz modificado con los movimientos resalte las diferencias




Esta primera imagen es un ala de adulto en muda completa.

Ya comentamos que observada comparativamente con una juvenil, siempre destacan los colores mas contrastados y los dibujos o barras de bordes más nítidos y perfilados.

Observamos que **todas las rémiges secundarias tienen igual colorido y contraste de unas respecto a las otras**. No hay ninguna diferencia por lo que concluimos que las ha mudado todas. La calificamos pues como ala de un adulto en muda completa. También destacamos o en la imagen las plumas guía para la calificación como adulto que son **las CPS, con las franja terminal estrecha y blanquecina. También la punta de las RP, que aunque no se observan en la foto son de borde liso y sin desgaste.**

Debemos no obstante hacer la reserva de que al no examinar la cara inferior, alguna de las CPI o CSI, pudieran no estar mudadas con lo que ya no sería la muda completa.

No está señalado pero también se puede observar el borde de las rémiges primarias a partir de la cuarta, que es de tendencia rectilínea con un pequeño resalte a diferencia del juvenil con tendencia a ser convexo



Vista inferior de una ala adulta en muda completa

En esta segunda imagen están señaladas ambas coberteras inferiores y se observa que todas tienen un color uniforme sin diferencias. La clasificamos pues como adulto en muda completa, con la reserva también del necesario examen de la cara superior por si hubiera alguna RS no mudada, con el color más apagado (en la cara inferior es más difícil de apreciar)



Adulto en muda suspendida

. mudada y nuevamente aparecen sin mudar las que siguen que son las CPI, salvo las señaladas con el nº 5, que son la una y la dos y sí mudadas Las CSI señaladas con los números 1,2,3, y 4 están sin mudar. A continuación hay otra pluma que sí está



Esta imagen es otro ejemplo de un ala de adulto en muda suspendida

Las Coberteras Inferiores CI sin mudar están señaladas con un asterisco. Hay dos Coberteras Primarias Inferiores (CPI) sin mudar casi superpuestas y otras dos secundarias también superpuestas.

La no muda de alguna CSI y CPI es bastante frecuente, tanto en machos como en hembras y tiene poco significado. Otra cosa es cuando el número de plumas no mudadas rebasa las veinte o las treinta. Se suele observar con frecuencia en las hembras, y es mucho más raro en los machos. Tiene relación con éxitos en la cría y segundas puestas.



Esta es la imagen de un adulto en muda suspendida visto por su cara superior.

Las rémiges secundarias que tienen numeración y que corresponden a las RS, primera segunda tercera y cuarta no están mudadas destacan claramente de la sexta, y siguientes que tiene las franjas oscuras bastante más resaltadas y sí están mudadas.

Para finalizar con el estudio de las alas del adulto debemos referirnos a aquellos, que solo tienen un año, es decir nacieron en la primavera del año anterior y que realizaron la primera muda completa, la denominada muda postnupcial. La anterior o muda juvenil que se lleva a cabo a partir de los cuarenta días de la eclosión es decir cuando el pollo se hace independiente, como ya comentamos es incompleta.

Cuando renueva todo su plumaje, es decir hace la primera muda postnupcial nunca sabremos con el ala en la mano si esa becada tiene un año dos o x años. Solamente cuando esa primera muda postnupcial o también llamada completa no lo es tal, en la becada del primer año, quedan unas plumas con las características juveniles que nos permiten con entera seguridad afirmar que es una becada, que nació el año anterior. Esas plumas con carácter juvenil son las CSI y CPI. Ver : [LAS PLUMAS GUIA](#) y la imagen siguiente



Las plumas CSI numeradas 1, 2 y 3 no han sido mudadas y tienen carácter de juveniles, por lo que el ala pertenece a un individuo adulto del 1º año en muda suspendida

La clasificación en MS1,2,3, o 4 está descrita en los capítulos precedentes, por lo cual no insistimos más, y esperando sea todo lo escrito y las imágenes útiles en la lectura de las alas

jjfuente